

KELTETÉSI NAPLÓ

Osztály	Nap	Dátum április	Hőmérséklet	Páratartalom	Hűtés	Forgatás
	0.		24°C	60%	-	-
6.b	1.	12. szerda	38°C	60%	-	IGEN
6.a	2.	13. csütörtök	38°C	60%	-	IGEN
5.b	3.	14. péntek	38°C	60%	-	IGEN
	4.		38°C	60%	10-15 perc	IGEN
	5.		37,8°C	60%	10-15 perc	IGEN
5.a	6.	17. hétfő	37,8°C	60%	10-15 perc	IGEN
7.b	7.	18. kedd	37,8°C	65%	10-15 perc	IGEN
7.a	8.	19. szerda	37,8°C	65%	10-15 perc	IGEN
8.o	9.	20. csütörtök	37,8°C	65%	10-15 perc	IGEN
Osztály	Nap	Dátum	Hőmérséklet	Páratartalom	Hűtés	Forgatás
1.a	10.	21. péntek	37,8°C	65%	10-15 perc	IGEN
	11.		37,6°C	65%	10-15 perc	IGEN
	12.		37,6°C	65%	10-15 perc	IGEN
1.b	13.	24. hétfő	37,6°C	65%	10-15 perc	IGEN
2.a	14.	25. kedd	37,6°C	65%	10-15 perc	IGEN

2.b	15.	26. szerda	37,6°C	65%	10-15 perc	IGEN
3.a	16.	27. csütörtök	37,6°C	70-80%	10-15 perc	IGEN
3.b	17.	28. péntek	37,6°C	70-80%	10-15 perc	IGEN
	18.		37,2°C	70-80%	10 perc	IGEN
	19.		37,2°C	70-80%	Max. 20 mp.	NEM
4.a	20.	01. hétfő	37,2°C	70-80%	Max. 20 mp.	NEM
4.b	21.	02. kedd	37,2°C	70-80%	Max. 20 mp.	NEM

CSIRKE KELTETÉSE

A néphagyomány szerint az igénytelen, szívós parlagi tyúkfajtákat tartó parasztság az első tyúktojásokat Bálint napján, azaz február 14-én "ültette el"

Valójában bármikor keltethetünk. – Csupán érdekességként, hogy a télen kelt csibék lényegesen szívósabbak, erősebbek, mint az év többi szakában kelt pipik.

21 nap a keltetési idő!

A sikeres keltetéshez szükséges:

1. kiváló minőségű egyforma méretű, termékeny tojás legyen
2. korábban megfelelően tárolva a tojás, max. 8 napos
3. a tojások legyenek tiszták
4. megfelelő hőmérséklet

5. megfelelő páratartalom – vízzel való feltöltés
6. tojások forgatása napi 2X
7. tojások szellőztetése napi 2X
8. lámpázással kiszedni a terméketlen záptojásokat
9. utolsó napokban langyos vízzel spricceljük, hogy puhuljon a tojáshéj

Az utolsó 3 napban hallani lehet kopogásokat, halk csipogást, rágást. A csibék először lyukasztanak, majd pihennek 6-12 órát, aztán repesztenek és kibújnak. Ha a csibéknek nincs erejük a tojást repeszteni és kibújni, 12 óra elteltével lehet rajtuk segíteni, különben befulladnak.

A csibéket csak a teljes megszáradásuk után vesszük ki a keltetőből.

Vannak tojások, amik 1 nappal korábban, illetve 1 nappal később kelnek, mint a többi.

Az első 24-36 órában a csibék nem vesznek magukhoz sem ételt, sem vizet. Első napokban célszerű kamillateát adni a csibéknek, hogy az kimossa a bélrendszerüket.

Vannak csibék, akik nem tudnak felállni, mivel szétcsúsznak a lábaik két oldalra. Ezeknek a lábait, vékony fonallal összekötjük, hagyva egy normális lépési távolságot. Pár nap után, amikor már stabilan rohangálnak, a fonalat el lehet távolítani.